

# PLANO DE VACINAÇÃO

Assim, como nos humanos as vacinas tem um papel cada vez mais importante na prevenção e erradicação de doenças graves também nos animais a sua aplicação se revela de grande importância.

A vacinação é, sem dúvida o melhor método de prevenção contra as doenças infecciosas contribuindo para a diminuição da morbidade e da mortalidade nos animais de companhia.

Os canídeos e os felídeos necessitam de várias doses vacinais para uma correcta estimulação do sistema imunitário e logo uma resposta efectiva no combate as doenças.

Seguir rigorosamente o protocolo vacinal aconselhado pelo seu médico veterinário pode evitar visitas à clínica e até mesmo salvar-lhe a vida.


A administração das vacinas é um acto praticamente indolor e, geralmente não envolve riscos. Deve ser efectuada pelo seu médico veterinário, o qual antes da aplicação da vacina realizará um exame físico completo que garante que não haja nenhuma contra-indicação na aplicação da vacina.

A maioria dos animais não manifesta qualquer reacção á vacina, embora, tal como acontece com qualquer outro fármaco, pode em alguns casos haver uma reacção alergica ao excipiente da vacina. Se notar que o seu animal está com edema ("inchaço") do focinho ou dificuldades em respirar depois da vacina não exite em contactar-nos.

## CÃES

1ª VACINA	6 Semanas	Esgana + Parvovirose	
2ª VACINA	9 Semanas	Esgana + Parvovirose + Hepatite + Leptospirose + Parainfluenza	
3ª VACINA	12 Semanas	Esgana + Parvovirose + Hepatite + Leptospirose + Parainfluenza	
4ª VACINA	16 Semanas	Raiva	

## GATOS

1ª VACINA	8 Semanas	Rinotraqueite infecciosa felina Herpesvírose Panleucopenia Panleucopenia Leucemia felina (opcional)	
2ª VACINA	11 Semanas	Rinotraqueite infecciosa felina Herpesvírose Panleucopenia Panleucopenia Leucemia felina (opcional)	








### CONTACTOS

URGÊNCIAS ▶ 276 323 472

Urb. da Formiguinha, Bloco 16 R/C LJ1  
5400-265 Chaves  
Portugal

Telefone: +351 276 323 472  
E-mail: geral@osbichos.pt

-  O plano vacinal perde o efeito e deverá ser reiniciado caso nao tenham sido cumpridas as datas dos **reforços vacinais**.
-  A **protecção vacinal só será efectiva 10-15 dias depois do último reforço**. Até este período, o seu animal não está protegido e por essa razão, deve evitar contacto com animais ou com locais por onde possam ter passado animais com plano vacinal desconhecido.
-  **Os cães e os gatos necessitam de uma revacinação anual** para as doenças anteriormente referidas.
-  Mediante a raça, a idade e as condições sanitárias do seu animal, ser-lhe-á aconselhado pelo seu veterinário um **protocolo vacinal adequado**.
-  Associado á vacinação, é importante cumprir um **plano de desparasitação interna e externa** fundamental para o bem estar do seu animal.